

Zeichne einen Dukatenfalter!



Dukatenfalter ***Lycaena virgaureae***

Das Dukatenfalter-Männchen besitzt eine orange leuchtende Flügeloberseite mit einem dunklen Rand. Das Weibchen hat viele dunkle Flecken auf der orangefarbenen Oberseite seiner Flügel (Sexualdimorphismus).

Das Vorkommen der Dukatenfalter ist in Berlin und Brandenburg durch Intensivierungsmaßnahmen und durch den Rückgang breiter Waldsäume zurückgedrängt. Er ist in der Roten Liste von Deutschland in der Stufe 3 als gefährdet eingestuft.

Der Falter ist in lichten Nadelwäldern mit Gemeinem Thymian (*Thymus pulegioides*) oder auf mageren, blütenreichen Wiesen mit Gemeiner Schafgarbe (*Achillea millefolium*), Giersch (*Aegopodium*) und Baldrian (*Valeriana*) zu finden. Wir haben ihn an Wasserdost (*Eupatorium cannabinum*) saugend angetroffen.

Der Dukatenfalter entwickelt eine Generation pro Jahr von Mitte Juli bis Ende August. Das weiße Ei überwintert angeheftet am vertrockneten Stengel des Sauerampfers. Die Raupen fressen nachtaktiv.

Die Flügelspannweite des Dukatenfalters beträgt 3,5 bis 4,0 cm.

Raupenfutterpflanzen: Ampfer (*Rumex spec.*), z.B. Wiesen-Sauerampfer (*Rumex acetosa*).